


Alimento complementar mineral dietético
Para vacas leiteiras

ACETOBOL

“ Suporte específico para o início da lactação ”

- Promove a ingestão de alimentos no pós parto
- Melhora as funções metabólicas, melhorando a conversão alimentar
- Específico para o início da lactação
- Contribui para o aumento da produção de leite no 1º mês de lactação



Natural
By TECHNIA /

ACETOBOL

Distribuído por :



Av. Infante D. Henrique, 333 H 3º Piso Esc.41
1800 – 282 Lisboa – geral@prodivetzn.pt
www.prodivetzn.com

Modo de emprego

- Aplicar 1 bólus por vaca, 7 a 5 dias antes do parto.
- Para animais de elevada produção ou em caso de perda de peso, renovar a aplicação 2 a 3 semanas após o parto.
- O tempo de libertação do ACETOBOL é de 21 dias.

Composição

☒ Plantas:

→ **Cardo do leite***, **Boldo***, **Alecrim***

* Produtos da transformação de plantas

☒ Cobre, Manganês, Zinco, Cobalto e Niacina

Os Bólus contêm 20% de ferro inerte para aumentar a sua densidade

Apresentação

- Caixas de 5 saquetas de 2 bólus
- Aplicação com aplicador próprio




Resultados dos ensaios

Ensaio: comparação entre grupos de vacas suplementadas ou não com ACETOBOL, cerca de 1 semana antes do parto entre 2015-2016


Retorno
do Investimento
4 para 1

% de vacas com acetonemia entre os 1-14 dias de lactação



■ Testemunha ■ ACETOBOL


Produção de leite durante o primeiro mês de lactação



* p<0,05

- Primíparas: aumento consistente de + 2 kg por vaca
- Robot de ordenha: a diferença aumenta ao longo do primeiro mês de lactação

Animais prontos a reproduzir



- Um melhor maneio do equilíbrio energético permite uma melhoria dos resultados reprodutivos: retorno à ciclicidade, sucesso das inseminações.

Estratégias de utilização

- Distribuição a toda a manada: 1 bólus cerca de 1 semana antes do parto
- Identificação dos animais em risco antes do parto: animais demasiado magros ou demasiado gordos no final do período de secagem, vacas de produção muito elevada na lactação anterior. Para estes animais: 1 bólus 1 semana antes do parto, 2º bólus cerca de 2 a 3 semanas após o parto
- Suportar o pico de produção e a reprodução: identificação das vacas que emagreceram cerca de 30-35 dias após o parto, 1 bólus por animal identificado